

DSV mais & sorghum 2027

Vitale rassen voor ieder bouwplan

DSV

Groei door innovatie

www.dsv-zaden.nl

Mais – vroeg / middenvroeg


	Vroegheid	FAO	Snijmais	Korrelmais	Zaden/ha
RELAYER	Ultravroeg	120	●●●	●●○	100.000-120.000
AMBIENT	Ultravroeg	120	●●○	●●○	100.000-120.000
LIKEit	Zeer vroeg	180	●●○	●○○	80.000-100.000
RAFTING	Vroeg	210	●●○	●●○	80.000-100.000
POLSAD	Middenvroeg	230	●●●	●●○	80.000-90.000
GLUTEXO	Middenvroeg	240	●●○	●●●	80.000-90.000




1
RELAYER – FAO 120
AMBIENT – FAO 120
LIKEit – FAO 180
RAFTING – FAO 210

2
AMBIENT – FAO 120
LIKEit – FAO 180
RAFTING – FAO 210
POLSAD – FAO 230

3
LIKEit – FAO 180
RAFTING – FAO 210
POLSAD – FAO 230
GLUTEXO – FAO 240





Bron: WUR Open Teelten, Rassenbulletin snijmais ultravroeg 2026 18 weken

Rowan Timmer
Sales manager ruwvoer & akkerbouw

"Ultravroege mais vindt steeds vaker een plek in het bouwplan. Mais oogsten vóór 1 september biedt kansen voor de invulling van de rustgewasverplichting op zand en löss. Daarnaast biedt een latere zaai ruimte voor de teelt van een voorvrucht."





RELAYER FAO 120

Flexibiliteit in gewasrotatie

- Nieuwe genetica
- Vroegste mais van Nederland
- Zeer hoge voederwaarde
- Goede opbrengst

AMBIENT FAO 120

Echt ultravroeg

- Zeer vroege bloei
- Hoog zetmeelgehalte
- Zeer goede resistentie tegen builenbrand
- Vitaal en betrouwbaar



RELAYER of AMBIENT zaaien?

Zowel RELAYER als AMBIENT leveren topprestaties binnen een zeer kort groeiseizoen en zijn al binnen 18 weken klaar om geoogst te worden. Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen en keuzeoverwegingen.

	RELAYER	AMBIENT
Vroegheid	●●●●●	●●●●○
Stevigheid	●●●●○	●●●○○
Builenbrandresistentie	●●●●○	●●●●●
Zetmeel	●●●○○	●●●●●
Verteerbaarheid	●●●●●	●●●○○
VEM	●●●●●	●●●●○
Opbrengst	●●●●○	●●●○○



LIKEIT

FAO 180

Your cows love it

- Snelle beginontwikkeling
- Combineert vroegheid met massa
- Grote, volledig gevulde kolven
- Zeer goede stevigheid, al jaren dé topper in Groot-Brittanië

RAFTING

FAO 210

Leidt je door een wild maisseizoen

- Goede koudetolerantie
- Geschikt voor heel Nederland
- Zeer lange kolf met veel zetmeel
- Robuuste mais die tegen een stootje kan

Roy Kuenen
Productmanager Ruwvoer

"RAFTING heeft zich de afgelopen jaren bewezen als betrouwbare alleskunner voor heel Nederland. Het is een massale, gezonde plant met een lange kolf die zorgt voor veel zetmeel."





POLSAD FAO 230

Betrouwbaar voor kuil en korrel

- Compacte, stevige plant
- Veel zetmeel in de goed gevulde kolf
- Hoge voederwaarde
- Goede droogtetolerantie







GLUTEXO FAO 240

De kolf die eruit knalt!

- Uitzonderlijk grote kolf, tot 22 rijen
- Hoog zetmeelgehalte
- Zeer goede verteerbaarheid
- Hoge drogestof- en korrel-opbrengst

Met de juiste rassen meer melk

Milk Index is het kwaliteitslabel van DSV zaden voor rassen met een aantoonbaar bovengemiddelde voederwaarde. Alleen rassen die aan deze hoge kwaliteitseisen voldoen, ontvangen dit label.

Meer over **Milk Index**

Zo draagt Milk Index bij aan het succes van uw bedrijf:

Meer melkproductie

Lagere voerkosten en besparen op krachtvoer

Hogere voeropname

Waarom sorghum telen?

Sorghum combineert een efficiënte benutting van water en nutriënten met een goede ruwvoerkwaliteit en veel structuur. Door de toenemende behoefte aan droogtetolerante gewassen en vruchtwisseling wordt sorghum steeds vaker toegepast op Nederlandse melkveebedrijven als waardevolle aanvulling op mais.




STRUCTUURRIJK & SMAKELIJK RUWVOER



GOED BESTAND TEGEN DROOGTE



RUSTGEWAS



EFFICIËNT WATER- EN NUTRIËNTENGEBRUIK

DSV Sorghum

Ras	Opbrengst	Voeder-waarde	Droogte-tolerantie	Stevigheid	Zaden/ha
VILOMENE	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●●●●	250.000
PIZARRO	●●●●●	●●●○○	●●●●○	●●●●○	300.000
BOVITAL	●●●○○	●●○○○	●●●●●	●●○○○	300.000
NUTRI HONEY	●●○○○	●●○○○	●●●●●	●●●○○	300.000




VILOMENE

Opbrengst en voederwaarde

VILOMENE is speciaal veredeld voor Nederlandse omstandigheden, waarbij de nadruk ligt op voederwaarde, snelle beginontwikkeling en vroege afrijping. De grote pluim op deze middellange plant zorgt voor een uitstekende combinatie van opbrengst en voederwaarde.

- Hoog pluimaandeel voor extra zetmeel
- Gezonde, stevige plant
- Combineert opbrengst met voederwaarde



Bron: DSV rassenproeven, 2020 & 2021

NIEUW

PIZARRO

Massaal gewas met grote pluim

PIZARRO is een nieuw sorghumras uit het veredelingsprogramma van DSV zaden. Dit opbrengst- en structuurtype kenmerkt zich door de zeer hoge opbrengst in combinatie met een grote pluim. De dikke stengels zorgen voor extra stevigheid.

- Vroege afrijping en hoge opbrengst
- Extra structuur en zetmeel
- Goede stevigheid





BOVITAL

Opbrengst en structuur

- Hoge opbrengstpotentie
- Structuurrijk ruwvoer
- Massale plant
- Vroege afrijping

NUTRI HONEY

Robuust ruwvoer

- Smakelijk ruwvoer
- Breed aanpassingsvermogen
- Suikerrijk
- Goed voor de bodemstructuur

SORGHUM-MAIS MIX

De mengteelt van sorghum en mais biedt een innovatieve en weerbare oplossing voor ruwvoerteelt en rustgewas. Deze combinatie van gewassen zorgt voor een stabiele opbrengst, ook onder droge of wisselende weersomstandigheden.

Sorghum-Mais Mix is ook inzetbaar als verplicht rustgewas op zand- en lössgrond.*

SORGHUM-MAIS MIX STRUCTUUR	
Samenstelling	74% Sorghum Bovital + 26% Mais
Zaaiadvies	170.000 zaden/ha (= 125.000 sorghum + 45.000 mais)
Zaaitijdstip	half mei – eind mei
Voordelen	• Robuuste teelt met veel opbrengst • Goede droogtetolerantie • Structuurrijk ruwvoer met goede voederwaarde • Geen concurrentie tussen mais en sorghum
Opbrengst	17 – 20 ton ds/ha
Voederwaarde	900 – 950 VEM/kg ds
Zetmeel	250 – 300 gr/kg ds



** Raadpleeg rvo.nl voor de actuele wet- en regelgeving*

Teelttips sorghum en Sorghum-Mais Mix

Download hier de **teelthandleiding voor sorghum**

ZAAIEN

Zaai niet te vroeg (vanaf half mei). Sorghum heeft voldoende bodemtemperatuur nodig voor een goede kieming en beginontwikkeling.

Het zaaizaad van sorghum is relatief klein ten opzichte van mais. Zaai dus wat minder diep (3 – 4 cm) voor een vlotte en gelijkmatige opkomst.

ONKRUIDBEHEERSING

Met mechanische bewerking voor en/of na opkomst kan de onkruiddruk aanzienlijk worden verminderd.

Er zijn in Nederland enkele gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. De gevoeligheid kan verschillen per ras en type sorghum. Om gewasschade te voorkomen, is het belangrijk altijd de juiste middelen, dosering en toepassingswijze te hanteren. Raadpleeg daarom altijd uw GBM-adviseur.

OOGSTEN

Sorghum is normaal gesproken rond dezelfde tijd als mais rijp om geoogst te worden (half september – half oktober). De bovenste korrels van de pluim zijn dan deegrijp, de onderste korrels melkrijp.

De optimale haksellengte (10 – 15 mm) is wat grover dan bij mais, omdat sorghum bij een iets lager drogestofgehalte wordt ingekuild.



DSV **MAISKNALLER!**

Nu **50.000** zaden **GRATIS!**



Maak kennis met DSV mais en profiteer!
Ontvang **50.000 zaden GRATIS** bij
een bestelling van 10 zakken mais.*

**Bekijk actievoorwaarden*

AI MODIFIED

DSV

www.dsv-zaden.nl

Neem contact met ons op



Tako van den Hul (1)
Sales manager ruwvoer & akkerbouw
+31 (0)6 2756 8479
tako.vandenhul@dsv-zaden.nl



Rowan Timmer (2)
Sales manager ruwvoer & akkerbouw
+31 (0)6 1895 8529
rowan.timmer@dsv-zaden.nl



Volg ons op social media:

DSV zaden Nederland B.V.
Zelder 1, 6599 EG Ven-Zelderheide
0485 550 983, info@dsv-zaden.nl