

## Nieuwe aanbevolen rassen van snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix (incl. rassen in onderzoek)

Er zijn 17 nieuwe maïsrassen opgenomen in de Aanbevelende Rassenlijst voor 2018. Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

De onderstaande rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (nieuw aanbevolen). De eigenschappen van de rassen staan vermeld in de tabellen.

### **Snijmaïs, zeer vroege en vroege rassen**

<b>Benedictio KWS</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
<b>DKC3172</b>	Kweker: Monsanto Technology LCC, St. Louis (USA) Vertegenwoordiger: Monsanto Holland B.V., Bergschenhoek
<b>LG 31.226</b>	Kweker: Limagrain Europe, Riom Cedex (F) Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland
<b>MAS 08F</b>	Kweker: Maisadour Semences, Haut-Maco (F) Vertegenwoordiger: Maisadour BNL, Baarlo
<b>RGT Koleoxx</b>	Kweker: RAGT 2n S.A.S., Rodez (F) Vertegenwoordiger: RAGT Benelux B.V., Kessel
<b>Smoothi CS</b>	Kweker: Caussade Semences S.A., Caussade (F) Vertegenwoordiger: Caussade Zaden Nederland B.V., Someren
<b>SY Rotango</b>	Kweker: Syngenta Seeds S.A.S., St. Saveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen

### **Snijmaïs, middenvroeg en middenlate rassen**

<b>Farmerino</b>	Kweker: FarmSaat AG, Everswinkel (D) Vertegenwoordiger: FarmSaat AG, Varsseveld
<b>Farmidabel</b>	Kweker: FarmSaat AG, Everswinkel (D) Vertegenwoordiger: FarmSaat AG, Varsseveld

**Snijmaïs, middenvroeg en middenlate rassen (vervolg)**

<b>Kalideas</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
<b>LG 31.235</b>	Kweker: Limagrain Europe, Riom Cedex (F) Vertegenwoordiger: Limagrain Nederland B.V., Rilland
<b>P8333</b>	Kweker: Pioneer Hi-Bred International Inc., Johnston (USA) Vertegenwoordiger: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, Breda
<b>Praefekt</b>	Kweker: Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Osterhofen (D) Vertegenwoordiger: Aga Saat GmbH & Co. KG, Neukirchen - Vluyn (D)
<b>SY Madras</b>	Kweker: Syngenta Seeds S.A.S., St. Saveur (F) Vertegenwoordiger: Syngenta Seeds B.V., Enkhuizen

**Korrelmaïs en corn cob mix**

<b>Benedictio KWS</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
<b>Lafelicita KWS</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
<b>KWS Modiano</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur
<b>KWS Stabil</b>	Kweker: KWS Saat S.E., Einbeck (D) Vertegenwoordiger: KWS Benelux, Etten-Leur

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het bedrijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in een gewaswerkgroep.

**Meer informatie**

Secretariaat CSAR: David Kasse, telefoon 079 – 30 30 333 of 06 – 52 06 43 26

Publicatie van de tabellen is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2018".

**Tabel 1a. Aanbevelende rassenlijst 2018 - Snijmaïs - Zeer vroege en vroege rassen**

Aanbevolen rassen

 Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017 <sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengeltoeresistentie	Buitenbrandresistentie	Helminthosporium-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei <sup>3)</sup>	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof <sup>4)</sup>	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek <sup>5)</sup>
<b>AANBEVOLEN RASSEN - Snijmaïs, zeer vroeg en vroeg</b>																		
N	MAS 08F	7,5	*	*	6	8,5	*	7	93	8	40,7	110	105	103	101	96	97	3
	Asgaard	8,5	8,5	*	7	8	*	7	98	8,5	40,4	109	105	106	100	97	97	5
N	Absalon	8,5	8	*	7,5	8,5	*	7	94	8,5	40,4	109	105	104	101	96	97	4
	LG 30.209	8	8	*	7	8,5	*	7,5	100	8	38,7	104	103	100	100	99	99	6
	DKC3333	8,5	8	*	7	8,5	*	7,5	97	7	38,4	103	98	94	101	99	99	6
	LG 31.211	7	7	*	7,5	8	*	7,5	100	8	38,1	103	102	101	101	101	102	5
	Leovox	7,5	7,5	8,5	7,5	8,5	*	8	97	8	38,0	102	99	96	101	97	98	6
	LG 31.218	7	7,5	*	7,5	8,5	*	7,5	102	8	37,7	102	101	101	101	100	100	5
	LG 30.211	8	8,5	8,5	8	7,5	7,5	7	99	8	37,6	102	100	99	99	98	98	6
	P8057	8,5	8	8,5	8	8,5	8,5	6,5	100	8	37,5	101	101	100	101	98	99	6
N	RGT Koleoxx	7,5	*	*	8,5	8,5	*	8,5	105	7,5	37,4	101	101	98	98	100	98	3
N	DKC3172	8	*	*	8	8,5	*	7,5	99	7,5	37,3	100	97	94	101	102	103	3
N	SY Rotango	7,5	*	*	6	7,5	*	6,5	102	7,5	37,2	100	103	101	100	100	100	3
	Farmezzo	7	6	*	7,5	8	*	7,5	106	7,5	37,0	100	100	98	99	102	101	5
N	Stacey	8,5	7,5	*	7,5	8,5	*	8	98	8	36,7	99	100	101	100	102	102	4
	Kompetens	7,5	8	*	8	8,5	*	7	99	8	36,7	99	102	101	100	101	101	5
	Movanna	8	7	*	7,5	7,5	*	7,5	105	7	36,6	99	98	98	97	101	98	6
N	LG 31.226	7,5	*	*	8	6	*	7,5	104	7,5	36,4	98	98	96	101	105	106	3
N	SY Skandik	7	7	*	7,5	8,5	*	6,5	100	7,5	36,4	98	98	99	100	103	103	4
	LG 30.215	7,5	7,5	*	8	8,5	*	8,5	106	8	36,4	98	103	104	99	100	99	5
	MAS 12H	8	8	*	8	8,5	*	6,5	104	7,5	36,4	98	102	102	99	98	97	6
N	Smoothi CS	7,5	7	*	6,5	8,5	*	8	105	7	36,3	98	97	98	97	102	98	4
	LG 30.218	8,5	8,5	9	7	8,5	7,5	7,5	96	7,5	36,0	97	99	100	100	99	100	6
	Denny	6,5	6,5	*	7	8,5	*	7	100	7,5	35,9	97	99	100	99	101	100	6
	LG 30.223	8	8	8,5	7	8	*	8	98	7,5	35,6	96	95	96	100	103	103	6
	LG 30.225	7,5	8	8,5	8	8,5	8	7,5	99	7,5	35,5	96	95	96	100	100	100	6
N	Benedictio KWS	8	*	*	7,5	9	*	8,5	108	7	35,5	96	95	95	98	107	105	3
	LG 30.224	7	7,5	8,5	8	8,5	*	6,5	101	7	34,9	94	91	93	101	103	103	6
	SY Milkytop	7	7	8	7,5	8	*	8,5	94	8	34,9	94	101	103	100	100	100	6
<b>100 = .. resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha</b>									<b>286</b>	<b>37,1</b>			<b>400</b>	<b>391</b>	<b>1010</b>	<b>21,6</b>	<b>21,8</b>	

**NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met de resultaten in tabel 2, middenvroeg, middenlate rassen.**
<sup>1)</sup> Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen.

Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.

<sup>2)</sup> Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

<sup>3)</sup> De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.

<sup>4)</sup> De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

<sup>5)</sup> Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.

Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

\* Onvoldoende resultaten beschikbaar

**Tabel 1b. Aanbevelende rassenlijst 2018 - Snijmaïs - Zeer vroege en vroege rassen**

Meerjarig onderzochte rassen - (nog) niet aanbevolen

 Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017<sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup> Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengeltoeristentie	Buitenbrandresistentie	Helminthosporium-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei <sup>3)</sup>	Drogestofgehalte gehele plant in %	Drogestofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof <sup>4)</sup>	Drogestofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek <sup>5)</sup>
<b>MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaïs, zeer vroeg en vroeg</b>																	
Autens KWS	*	*	*	6	8,5	*	9,5	107	8,5	40,7	110	106	104	99	99	98	2
KXB5007	*	*	*	5,5	8	*	9	107	8,5	40,7	110	100	89	98	98	97	2
KXB5012	*	*	*	6	7,5	*	8,5	102	8,5	40,5	109	105	98	99	96	95	2
CET150112	*	*	*	5	7,5	*	8,5	94	8,5	40,2	108	106	98	101	96	96	2
LG 31.205	*	*	*	8,5	7,5	*	6	110	8,5	38,6	104	106	108	101	105	106	2
X75K374	*	*	*	5,5	8,5	*	8,5	108	8	38,2	103	100	98	97	101	98	2
KXB5302	*	*	*	5	6,5	*	8	109	7	37,8	102	103	105	98	104	102	2
Kapriilas	*	*	*	6,5	8	*	8,5	109	7,5	37,6	101	100	97	99	105	104	2
MAS 10A	8	*	*	7,5	8,5	*	7,5	102	8	37,5	101	101	98	99	96	95	3
Havelio KWS	7	*	*	5,5	8	*	8,5	105	7,5	37,1	100	100	97	99	105	105	3
X75K345	*	*	*	6	8	*	7,5	111	7,5	36,9	99	99	97	96	103	99	2
X75K382	*	*	*	5	8,5	*	7,5	103	7,5	36,8	99	103	103	98	102	100	2
SY Telias	*	*	*	6	8	*	7,5	99	7	36,6	99	102	104	99	106	105	2
BPZ5115	*	*	*	6	8	*	7,5	103	7,5	36,4	98	97	98	97	110	106	2
LZM166/73	*	*	*	7,5	8,5	*	7	108	8	36,3	98	102	107	100	103	104	2
KWS Eminent	*	*	*	7,5	7,5	*	8	105	8	36,2	98	98	100	98	104	102	2
Susetta	*	*	*	8	8	*	7,5	113	7	36,1	97	91	92	97	102	99	2
SY Talisman	*	*	*	7,5	8	*	8	107	7	36,1	97	97	100	98	104	101	2
LG 31.239	*	*	*	7,5	8	*	8	106	7	35,9	97	91	91	99	106	104	2
VDZ9904	*	*	*	6,5	8	*	7	105	6,5	35,8	97	99	99	98	104	102	2
ESZ6101	*	*	*	7	7,5	*	7,5	108	8,5	35,8	96	99	102	100	102	102	2
SA0825	*	*	*	6	8	*	8	99	7,5	35,7	96	101	104	102	103	105	2
CLK137	*	*	*	7,5	8	*	7	104	7,5	35,0	94	94	97	99	102	101	2
VDZ9906	*	*	*	7,5	8,5	*	6,5	102	7	34,5	93	99	103	98	105	102	2
<b>100 = .. resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha</b>								<b>286</b>	<b>37,1</b>			<b>400</b>	<b>391</b>	<b>1010</b>	<b>21,6</b>	<b>21,8</b>	

**NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met de resultaten in tabel 2, middenvroeg, middenlate rassen.**
<sup>1)</sup> Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen.

Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.

<sup>2)</sup> Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

<sup>3)</sup> De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.

<sup>4)</sup> De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

<sup>5)</sup> Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.

Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

\* Onvoldoende resultaten beschikbaar

**Tabel 2a. Aanbevelende rassenlijst 2018 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen**  
Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017 <sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei <sup>3)</sup>	Drogstofgehalte gehele plant in %	Drogstofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof <sup>4)</sup>	Drogstofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek <sup>5)</sup>
<b>AANBEVOLEN RASSEN - Snijmaïs middenvroeg en middenlaat</b>																		
	Juvento	8	8,5	*	8,5	8	7	9	98	8,5	38,7	106	102	98	101	98	100	5
N	Farmerino	7,5	*	*	7,5	7,5	*	7	100	7,5	37,9	104	106	104	99	96	95	4
	Farmfire	5,5	7,5	*	7	8,5	7	7,5	102	7	37,4	102	98	96	99	102	100	6
	LG 30.232	8	8,5	8,5	8,5	7	7	8,5	97	8	37,1	102	94	92	100	99	99	6
N	Genialis KWS	8	*	*	8	8,5	8	8	97	7,5	36,9	101	100	100	100	102	102	4
	Torres	8	7	7	8	8,5	8	8,5	100	8,5	36,9	101	104	101	101	98	99	6
	Fenizia	5,5	6,5	*	7	6,5	6,5	8	104	7,5	36,9	101	99	98	98	101	99	5
N	SY Madras	7	6	*	8	7,5	7	9	100	8	36,5	100	95	94	100	101	101	5
N	Farmerkel	6,5	*	*	7	7,5	8	8	101	7,5	36,5	100	103	106	99	103	102	4
N	LG 31.235	7,5	*	*	8,5	7,5	7,5	7	98	7,5	36,2	99	96	98	102	98	100	4
N	P8333	6,5	*	*	7,5	7	*	7,5	106	6,5	35,9	98	92	93	98	105	103	3
N	Praefekt	6	*	*	6,5	7	8	7,5	103	7	35,5	97	97	100	98	102	99	3
N	Kalideas	8,5	*	*	6,5	8,5	*	8,5	99	7	35,2	96	97	99	100	102	102	3
	Mokka	7,5	7,5	8	8	8	7,5	7	96	8	34,6	95	100	103	100	97	97	6
	SY Fanatic	8	7	*	8	8	8	6,5	102	7	34,5	94	94	98	102	99	101	5
N	Farmidabel	7	*	*	7,5	7	*	7	101	7,5	33,5	92	98	104	99	99	98	3
	<b>100 = .. resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha</b>								<b>307</b>			<b>36,6</b>	<b>397</b>	<b>388</b>	<b>1007</b>	<b>22,9</b>	<b>23,0</b>	

**NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met de resultaten in tabel 1, zeer vroege en vroege rassen.**

<sup>1)</sup> Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.

<sup>2)</sup> Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

<sup>3)</sup> De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.

<sup>4)</sup> De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

<sup>5)</sup> Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.

Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

\* Onvoldoende resultaten beschikbaar

**Tabel 2b. Aanbevelende rassenlijst 2018 - Snijmaïs - Midden vroege en midden late rassen**  
Gemiddelde resultaten over de jaren 2012 t/m 2017 <sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Stevigheid	Zomerlegering	Green snap	Stengelrotresistentie	Builenbrandresistentie	Helminthosporium-tolerantie	Snelheid grondbedekking	Plantlengte	Vroegheid bloei <sup>3)</sup>	Drogstofgehalte gehele plant in %	Drogstofgehalte	Zetmeelgehalte bij oogst	Zetmeelgehalte bij 35% drogestof	VEM/kg drogestof <sup>4)</sup>	Drogstofopbrengst	VEM-opbrengst	Aantal jaar in onderzoek <sup>5)</sup>
<b>MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - Snijmaïs middenvroeg en middenlaat</b>																		
	Kordalis	*	*	*	7	*	*	8,5	100	8	39,5	108	102	96	101	99	100	2
	AGA5126	*	*	*	7	*	*	7,5	101	7,5	38,3	105	101	100	100	99	100	2
	Rigoletto	*	*	*	5,5	*	*	7,5	110	7	37,7	103	100	104	99	104	103	2
	BPZ4112	*	*	*	7	*	*	7,5	105	6,5	37,2	102	96	98	97	100	97	2
	Agro Polis	4,5	*	*	6	7	*	7,5	109	7	37,1	101	99	97	98	103	101	3
	AGA5121	*	*	*	7,5	*	*	6	104	6,5	37,0	101	98	99	99	96	96	2
	Korynt	4,5	*	*	7,5	8	*	7,5	102	7	36,9	101	97	96	98	102	100	2
	SB 1165	*	*	*	6,5	*	*	7,5	106	7	36,8	101	100	104	99	102	101	2
	SY Harmonic	8	*	*	8,5	8,5	*	7	105	7	36,7	100	95	96	101	99	100	3
	P7932	7,5	*	*	7,5	8	7	8	107	7	36,6	100	94	95	99	101	100	3
	Severeen	*	*	*	8	*	*	6,5	107	7	36,6	100	98	100	100	103	103	2
	AIC16B004	*	*	*	8	*	*	7	102	7,5	36,5	100	101	105	99	97	97	2
	X80K191	*	*	*	6	*	*	7,5	107	6,5	36,5	100	98	100	96	101	97	2
	SMF0150	*	*	*	7,5	*	*	7	101	7,5	35,7	98	102	107	100	97	98	2
	RH15037	*	*	*	8	*	*	8,5	107	7	35,5	97	96	100	98	101	99	2
	SMF0301	*	*	*	8	*	*	7	98	7,5	35,1	96	100	103	98	99	97	2
	Farmirage	*	*	*	7	*	*	7	106	6,5	35,0	96	99	104	98	102	100	2
	Rukraft	6,5	*	*	8	7,5	6,5	7,5	103	7,5	35,0	96	91	95	100	101	101	4
	SMF0140	*	*	*	7	*	*	6,5	101	7,5	34,7	95	101	107	100	101	100	2
	SY Gordius	*	*	*	7	*	*	7	105	7	34,6	95	92	97	101	103	105	2
	BPZ5107	*	*	*	7,5	*	*	7,5	104	7	34,5	95	98	102	98	100	99	2
	P8666	7	*	*	8	5	*	7,5	105	6	34,5	94	88	92	98	104	102	3
	MGM298115	*	*	*	8	*	*	7	113	5,5	34,3	94	86	90	94	99	93	2
	CET141005	*	*	*	7	*	*	7	103	6,5	33,6	92	98	103	99	101	100	2
	SMF0134	*	*	*	8	*	*	7	108	7	33,5	92	94	100	99	100	100	2
	<b>100 = .. resp. in cm, %, gr/kgds (2x), VEM/kgds, ton/ha, 1000 kVEM/ha</b>								<b>307</b>			<b>36,6</b>	<b>397</b>	<b>388</b>	<b>1007</b>	<b>22,9</b>	<b>23,0</b>	

**NB. Vanwege andere standaardrassen en proeflocaties zijn de resultaten niet te vergelijken met de resultaten in tabel 1, zeer vroege en vroege rassen.**

<sup>1)</sup> Plantlengte, drogestofgehalte, zetmeelgehalte, VEM/kgds, drogestofopbrengst en VEM-opbrengst weergegeven in verhoudingsgetallen. Drogestofgehalte ook in absolute waarde. Overige eigenschappen in waarderingscijfers, waarbij een hoog cijfer voor een gunstige waardering staat.

<sup>2)</sup> Rassen staan gerangschikt op volgorde van vroegheid. Rassen die 1 of 2 jaar op de lijst staan zijn aangeduid met een N - Nieuw Aanbevolen.

<sup>3)</sup> De vroegheid van vrouwelijke bloei is vooral van belang in ongunstige jaren. Bij rassen met een gelijk drogestofgehalte hebben laat bloeiende rassen in die jaren vaak een lager drogestofgehalte.

<sup>4)</sup> De VEM/kgds is bepaald met NIRS, gekalibreerd op Tilley en Terry.

<sup>5)</sup> Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek.

Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

\* Onvoldoende resultaten beschikbaar

**Tabel 3. Aanbevelende rassenlijst 2018 - Korrelmaïs en corn cob mix**  
Gemiddelden over de jaren 2012 t/m 2017<sup>1)</sup>

Rubricering <sup>2)</sup>	Rasnaam	Snelheid grondbedekking	Vroegheid bloei	Plantlengte	Helminthosporium-tolerantie	Oogstbaarheid <sup>3)</sup>	Stengelrotresistentie	Stevigheid	Zomerlegering	korrel			Aantal jaren in onderzoek <sup>6)</sup>	
										Vochtgehalte <sup>4)</sup>	Drogestofgehalte	Drogestofopbrengst <sup>5)</sup>		
<b>AANBEVOLEN RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix</b>														
N	KWS Stabil	7,5	7	108	*	7	6,5	7,5	*	25,0	104	100	3	
	Coryphee	8	9	93	7,5	8	7,5	8,5	8,5	25,0	104	89	6	
	Hyperion KWS	8,5	8	98	6	7,5	7	8,5	9	25,4	104	92	6	
N	Benedictio KWS	8,5	6,5	105	*	7,5	7	8	*	27,1	101	99	3	
	Ricardinio	8	7,5	106	7	7	7	7,5	8,5	27,6	101	100	6	
N	Lafelicita KWS	7,5	8,5	98	*	7	6,5	6,5	*	27,9	100	101	3	
	Genialis KWS	7,5	7	98	7,5	8	7,5	8	7,5	28,1	100	100	5	
N	Megusto KWS	8	9	99	*	7	6,5	7,5	*	28,2	100	106	4	
	Kompetens	6,5	8	95	8	8	7,5	8,5	8	28,2	100	100	5	
N	KWS Modiano	8,5	8	105	*	8	7,5	7	*	28,3	100	103	3	
N	Successor KWS	8	7,5	102	7,5	6,5	6	8	8	28,7	99	101	5	
N	LG 31.211	7,5	8	94	*	7	6,5	8	*	28,7	99	99	4	
	ES Crossman	7,5	7	109	7	7	7	6	7	28,9	99	101	5	
	Millesim	8	8	98	7	8,5	8	8	8,5	29,5	98	100	6	
<b>MEERJARIG ONDERZOCHE RASSEN - korrelmaïs en corn cob mix</b>														
	P7043	7	7	98	*	6,5	6,5	7	*	25,9	103	94	3	
	ES Arlequin	7,5	7	101	*	6	5,5	7,5	*	26,2	103	95	3	
	Amanova	8	8	104	*	6,5	6,5	*	*	26,9	102	103	2	
	ES Eurojet	7,5	7,5	109	*	8	7,5	7	*	27,3	101	98	3	
	ES Hubble	8,5	7	111	*	9	8,5	*	*	27,3	101	101	2	
	Agro Fides	8,5	7,5	101	*	8,5	7,5	*	*	27,6	101	102	2	
	KWS Eminent	8	8	101	*	8	7,5	*	*	29,4	98	103	2	
<b>100 = ..resp. in cm, % en ton/ha</b>				<b>303</b>						<b>71,9</b>		<b>11,7</b>		

<sup>1)</sup> Plantlengte, drogestofgehalte en drogestofopbrengst zijn weergegeven in verhoudingsgetallen

<sup>2)</sup> Rassen gerangschikt op volgorde van vroegheid. N - Nieuw Aanbevolen, rassen die voor 1e of 2e jaar op de lijst staan.

<sup>3)</sup> Oogstbaarheid duidt op de kans op omgevallen planten door zowel een stengelrotaantasting als door gebrek aan stevigheid. Beide eigenschappen zijn ook afzonderlijk aangegeven.

<sup>4)</sup> Vochtgehalte is 100 - drogestofgehalte (absoluut). Laag vochtgehalte betekent lagere droogkosten en is dus gunstig voor korrelmaïs

<sup>5)</sup> 100 = 13,4 ton/ha bij 16% vocht (korrelmaïs) en 17,3 ton/ha bij 35% vocht (corn cob mix).

<sup>6)</sup> Na minimaal 3 jaar onderzoek kan een ras worden aanbevolen. Betrouwbaarheid van cijfers is groter bij meer jaren van onderzoek. Sommige rassen staan al langer dan 6 jaar op de Rassenlijst, maar resultaten worden gebaseerd op de laatste 6 jaar.

\* Onvoldoende resultaten beschikbaar